

Gebrauchsinformation

Liebe Patientin, lieber Patient!

Bitte lesen Sie diese Gebrauchsinformation aufmerksam, weil sie wichtige Informationen darüber enthält, was Sie bei der Anwendung dieses Arzneimittels beachten sollen. Wenden Sie sich bei Fragen bitte an Ihren Arzt oder Apotheker.

SANUVIS® Flüssige Verdünnung

Homöopathisches Arzneimittel

Zusammensetzung:

100 ml flüssige Verdünnung enthalten:

Arzneilich wirksame Bestandteile:

20 ml **Acidum L (+)-lacticum D4 dil.** potenziert mit Ethanol 10 % (m/m) nach Vorschrift 5a HAB

20 ml **Acidum L (+)-lacticum D6 dil.** potenziert mit Ethanol 10 % (m/m) nach Vorschrift 5a HAB

20 ml **Acidum L (+)-lacticum D12 dil.** potenziert mit Ethanol 10 % (m/m) nach Vorschrift 5a HAB

20 ml **Acidum L (+)-lacticum D30 dil.** potenziert mit Ethanol 10 % (m/m) nach Vorschrift 5a HAB

20 ml **Acidum L (+)-lacticum D200 dil.** potenziert mit Ethanol 10 % (m/m) nach Vorschrift 5a HAB

Sonstige Bestandteile: Gereinigtes Wasser, Ethanol.

Darreichungsform und Inhalt: 100 ml / 1000 ml (10 x 100 ml) flüssige Verdünnung zum Einnehmen.



Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller:

SANUM-KEHLBECK

GmbH & Co. KG

Arzneimittelherstellung

Postfach 1355 · D-27316 Hoya

Anwendungsgebiete: Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation.

Hinweis an den Anwender: Bei während der Anwendung des Arzneimittels fortdauernden Krankheitssymptomen soll medizinischer Rat eingeholt werden.

Gegenanzeigen:

*Wann dürfen Sie **SANUVIS®** erst nach Rücksprache mit Ihrem Arzt anwenden?*

Bei Alkohol- oder Leberkranken sollte aufgrund des Alkoholgehaltes das Arzneimittel nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.

Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung:

Was müssen Sie in der Schwangerschaft und Stillzeit beachten?

Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen zur Anwendung in der Schwangerschaft und Stillzeit vorliegen, sollte das Arzneimittel nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.

Was ist bei Kindern zu berücksichtigen?

Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht angewendet werden.

Wechselwirkungen mit anderen Mitteln: Keine bekannt.

Allgemeiner Hinweis: Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genußmittel ungünstig beeinflusst werden. Falls Sie sonstige Arzneimittel einnehmen, fragen Sie Ihren Arzt.

Warnhinweise: Dieses Arzneimittel enthält 12,4 Vol.% Alkohol (Ethanol).

Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Die folgenden Angaben gelten, soweit Ihnen der Arzt nichts anderes verordnet hat. Bitte halten Sie sich an die Anwendungsvorschriften, da dieses Arzneimittel sonst nicht richtig wirken kann!

Wieviel und wie oft sollten Sie **SANUVIS®** anwenden?

Soweit nicht anders verordnet: 3 mal täglich 60 Tropfen (ca. 1 Teelöffel bzw. 1/2 Eßlöffel) vor den Mahlzeiten einnehmen.

Wie lange sollten Sie **SANUVIS®** anwenden?

Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.

Nebenwirkungen: Keine bekannt.

Wenn Sie jedoch Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.

Hinweis: Bei Einnahme von homöopathischen Arzneimitteln können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen.

Hinweise und Angaben zur Haltbarkeit des Arzneimittels: Das Verfalldatum ist auf dem Flaschenetikett und der äußeren Umhüllung aufgedruckt. Verwenden Sie diese Packung nicht mehr nach diesem Datum!

Bitte verschließen Sie die Flasche sofort nach Gebrauch.

Stand der Gebrauchsinformation: 01. 02. 2003.

Hinweis: Bitte bewahren Sie das Arzneimittel für Kinder unzugänglich auf!



Trennung
an der abstehenden
Lasche
anfassen
und runderherum
abziehen.



Weiße Schutzkappe
mit Daumen und
Zeigefinger
kräftig anfassen
und zur Seite
abknicken.



Tropfenweise Ent-
nahme durch vor-
sichtiges Zusammen-
drücken der Gummipi-
pette mit Daumen
und Zeigefinger



Nach Gebrauch
Schutzkappe fest auf-
drücken bis sie hörbar
einrastet. Hierdurch
dichter Verschluss der
Tropfflasche.

Zur weiteren Anwendung stehen **SANUVIS®** Injektionen, Tabletten und Salbe zur Verfügung.